

FACTSHEET “Género, mujer y salud”  
Día mundial de la mujer

- La salud de las mujeres en edad reproductiva (entre los 15 y los 49 años) es muy relevante tanto para las mismas mujeres como para el impacto en la salud y el desarrollo de la siguiente generación.
- Las complicaciones del embarazo y del parto son algunas de las causas principales de mala salud y mortalidad de las mujeres en todo el mundo.
- Cada día 1.600 mujeres y más de 10.000 recién nacidos mueren a causa de estas complicaciones prevenibles en el embarazo o el parto. Casi el 99% de la mortalidad materna y el 90% de la infantil ocurren en países en vías de desarrollo.
- Unos 14 millones de niñas adolescentes se convierten en madres cada año y más del 90% viven en países en vías en desarrollo.
- Las niñas y las mujeres son particularmente vulnerables al VIH debido a una combinación de factores biológicos y de desigualdades basadas en el género, sobre todo en culturas donde tienen limitada la información sobre el VIH, sobre la protección y las habilidades para establecer relaciones sexuales seguras.
- 33,4 millones de personas en el mundo viven con el VIH, y de éstos, 15,7 millones son mujeres. La infección por el virus del sida es la principal causa de mortalidad y de enfermedad entre las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) de todo el mundo.
- Un 70% de las mujeres del mundo se han visto forzadas a tener relaciones sexuales sin protección.
- La tuberculosis está a menudo asociada con la infección por VIH y es la tercera causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva en países de bajo y medio ingreso en el mundo.
- A pesar de que suelen ser más pobres o desempleadas, las mujeres soportan costes de atención sanitaria más altos que los hombres ya que los usan más habitualmente.